

喜伯樂豬大腸桿菌、梭狀菌不活化混合菌苗**COLISUIN-CL**

【成份】每 1 劑量(2 ml)含：

<i>E. coli</i> adhesion factor K88 ab	3.28 x 10 ³ HAU
<i>E. coli</i> adhesion factor K88 ac	3.28 x 10 ³ HAU
<i>E. coli</i> adhesion factor K99	1.60 x 10 ² LU
<i>E. coli</i> adhesion factor 987P	6.40 x 10 LU
<i>E. coli</i> enterotoxoid	3.20 x 10 CCTU
Toxoid of type C <i>Cl. perfringens</i>	0.1 ml
Toxoid of type B <i>Cl. novyi</i>	0.1 ml

豬腸胃感染在目前的豬隻疾病中，其重要性與日遽增。由於近來發現大部分的大腸桿菌腸病毒株普遍具有致病因子 LT 腸毒素以及附著因子，使得多數腸胃感染症病例的控制有了實質的進步。

喜伯樂豬大腸桿菌、梭狀菌不活化混合菌苗除了含有大腸桿菌最常導致腸道感染的病株之主要抗原片段，更含有可控制仔豬壞死性腸炎（產氣莢膜梭菌 C 型）以及種母豬、肥育豬猝死症（諾維氏梭菌 B 型）兩種疾病的必需類毒素。

【效能】

預防豬大腸桿菌症、仔豬壞死性腸炎，以及母豬、肥育豬的腸毒血症（猝死症）。

【用法用量】於耳根後方之頸部作深層肌肉注射。每頭母豬給予 2 ml（相當一劑量）。免疫懷孕女豬及母豬。在分娩前 50~60 天免疫第一劑，分娩前 25~30 天再追加一劑。非第一次免疫者，於分娩前 30 天免疫一劑即可。

猝死症發生時（母豬之腸毒血症），所有懷孕及哺乳中的母豬均注射一劑，4 週後再補強一劑。

【副作用】

動物使用本疫苗可能會出現過敏反應，請以抗組織胺類(antihistamine)類藥物紓解。

【注意事項】

1. 本產品僅能免疫於健康動物。
2. 請勿於分娩前 2 週或配種後 2 週內施打本劑，以防止因緊迫而造成母豬流產或胎兒重吸收。
3. 請使用 4~5 公分長之針頭注射，避免局部腫脹。
4. 本產品需保存於 2~8 之陰暗處。請搖勻後再使用。
5. 使用前請先將疫苗置於室溫，待其回溫至 15~25 後方可進行注射。
6. 本產品須由執業獸醫師或執業獸醫佐使用或在其監督之下使用。

【停藥期】無。

【包裝】10 劑量（20 ml）/ 瓶，50 劑量（100 ml）/ 瓶。



西班牙喜伯樂大藥廠出品

建盈股份有限公司總代理

台北信義路四段 307 號 12 樓 0800212818