

【六雙啖】

COHEDIN SOLUTION

【成份】每毫升含 Chlorhexidine (1,1-Hexamethylene-bis[5-(p-chlorophenyl)biguanide]) diacetate2%

【效能與用量】

- ◎非動物體的消毒：控制犬瘟熱、馬流行性感冒、傳染性胃腸炎、副流行性感冒第三型、牛鼻氣管炎、牛病毒性下痢、傳染性支氣管炎、委內瑞拉馬腦炎、馬鼻肺炎、貓鼻氣管炎、假性狂犬病、馬動脈炎、犬冠狀病毒等病毒病原體：每加侖清水加入 3 盎司的【六雙啖】（約 43 倍稀釋）。【六雙啖】在實驗室中亦經證明，可以上述建議濃度殺滅狂犬病毒（CVS 株）。
 - ◎獸醫或畜牧場房舍的消毒：每加侖清水加入 1 盎司【六雙啖】（每公升清水加入 7.75 毫升【六雙啖】，約 129 倍稀釋）。
 - ◎肉、禽類、兔子及蛋類加工廠的消毒：每加侖清水加入 1 盎司【六雙啖】（每公升清水加入 7.75 毫升【六雙啖】，約 129 倍稀釋）。
 - ◎以乳頭浸漬方式控制細菌性乳房炎：於大小適當之容器內加入 32 盎司【六雙啖】及 6 盎司甘油，加入乾淨飲用水至總體積為 1 加侖（約為 215 毫升【六雙啖】加約 43 毫升甘油，再加入乾淨飲用水至總體積為一公升。約 5 倍稀釋）。
- *根據 A.O.A.C. 標準稀釋法，本產品對綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）及器具表面之革蘭氏陽性球菌無殺菌效果。

【使用方法】

◎獸醫或畜牧場房舍：

1. 將房舍、車輛及其他設備中之動物及飼料移開。
2. 清除位於圍欄、畜舍、斜坡、動物曾經過或置留之設備、固定器地面、牆壁等表面上之墊草與糞便。
3. 排空所有凹槽、置物架、餵飼及飲水設備。
4. 用肥皂或清潔劑徹底清洗所有表面，再以清水沖淨。
5. 以推薦濃度之消毒溶液浸透所有需消毒物品之表面 10 分鐘。
6. 浸泡所有繫繩、繩索、及其他用來固定或繫留動物之設備，以及各種清除墊草與糞便之耙子、鏟子及刮除工具。
7. 要使用所有經處理之飼料槽、水槽、自動餵食器、自動供水器及飲水器之前，請徹底用肥皂或清潔劑刷洗並以清水沖洗。

◎使用在肉、禽類、兔子及蛋類加工廠：

1. 所有食品及包裝必須移出或妥善覆蓋及隔離。
2. 清除可能留在地面或與設備接觸的塵土、雜亂物品。
3. 以肥皂或清潔劑徹底清洗所有表面，並以清水沖淨。
4. 以推薦濃度之消毒液浸透、浸泡所有需要消毒的物品/表面 10 分鐘。
5. 暴露或浸泡所有設備與容器於推薦濃度之消毒溶液中 10 分鐘。
6. 使用經消毒劑處理之設備及器皿前，需以可飲用之清水徹底清洗乾淨。

◎以乳頭浸漬方式控制細菌性乳房炎：

乳牛擠乳後立即將每個乳頭浸入浸泡液中。乳牛應在產犢前一週開始浸泡乳頭，乾乳期時亦可持續浸泡。每天浸泡一次，連續 3~4 天。擠乳前需徹底清潔乳房及乳頭。

【儲存及處理】

- ✕禁止：在儲存與處理過程中，不可污染水源、食物及飼料。禁止公開傾倒。空罐不可重複使用。不可冷凍。
- 待廢棄處理之溶液應儲存於乾燥陰涼、且孩童無法取得之處。
- 混有本產品之溶液應收集丟棄於適當之處理設備中。
- 裝盛本產品之容器不可重複使用。空罐需以清水沖洗後方可丟棄。
- 關於其他適當之處理方法（如公開燃燒等），詢問主管機關。

【注意事項】

1. 本產品（原液）具腐蝕性，對人及家畜有害。
2. 長時間或頻繁接觸皮膚可能引發過敏。若衣物不慎沾染本液，應立刻換下，徹底洗淨後方可再次穿著使用。
3. 本產品具腐蝕性，若接觸眼睛會造成不可逆之傷害。使用時請配戴護具（護目鏡或面罩）。
4. 吞入、吸入或經皮膚吸收皆具傷害性。
5. 急救處理：**誤觸眼睛**：眼睛保持睜開，以清水溫和、持續沖洗 15-20 分鐘。若配戴隱形眼鏡，請於沖洗 5 分鐘後小心移除、再繼續沖洗。聯絡毒物中心或醫療單位或立刻就診，取得後續處置建議或協助。
- 誤食**：立刻聯絡醫療單位或立刻就診，取得後續處置建議或協助。若傷者仍有吞嚥能力，請立即飲用清水。若無醫師或醫療人員指示，不可催吐。
- 誤觸皮膚**：換下沾染本液之衣物。立刻以大量清水沖洗 15-20 分鐘。聯絡毒物中心或醫療單位或立刻就診，取得後續處置建議或協助。
- 不慎吸入**：立即將傷者移至空氣流通處，聯絡毒物中心或醫療單位或立刻就診，取得後續處置建議或協助。若傷者已無呼吸，則立刻執行人工呼吸、並撥打 119 請派救護車協助
6. 對環境之影響：勿污染水源。不可將含有本液之溶液任意引流或傾倒入湖泊、溪流、池塘、河口或海灣及其他水環境。應依照主管機關或環保署之規定處理。

【包裝】：250ml、500ml、925ml、1.85L、3.7L(桶)裝

製造廠：建盈股份有限公司

地址：雲林縣斗六市工業區民治街 11 號