

# 爵洛得 - P

## JURAMATE-P

### 母(女)豬專用前列腺素注射液

**【成分】**

每毫升本劑含 Cloprostenol sodium ...92ug (相當於 Cloprostenol ... 87.5ug)。

另有 0.1%w/v 的 chlorocresol 作為殺菌劑。

**【效用】**

本劑可用於誘導母豬及女豬分娩。

Cloprostenol 為合成的前列腺素異構物，其結構與 PGF<sub>2</sub>α 相似。本劑為超強黃體溶解劑，在多種情況下皆可使功能性黃體溶解、或引起黃體型態上的退行性變化（解黃體作用）。利用 Cloprostenol 之解黃體作用可誘導母豬或女豬分娩，使畜舍管理更加方便且有效率。其作用如下：

- 可統一控制同批母豬或女豬之分娩時間。
- 調整豬隻分娩時間：可避開週末、假日或晚間。
- 加速分娩進行與管理，並利於排定分娩日程、畜舍及設備等。
- 便於分配代養仔豬。
- 避免懷孕母豬延長分娩日數。

**【用法用量】**

1. 每頭動物每次 2 毫升（一劑量）深層肌肉注射。
2. 建議使用 1.5 吋長、19-22G 的注射針頭。

**【使用建議】**

爵洛得-P 僅可使用於發情記錄完善之豬隻。若過早注射（預產期 2 天之前）可能造成分娩時死胎數增加。因此，必須詳細建立各懷孕豬隻之發情分娩記錄以準確估算預產期：將配種日標記為第 0 天，以此推算。一般狀況下，母豬懷孕期為 111~119 天、平均為 115 天。請畜主詳細計算各批豬隻之平均分娩日期，於分娩前 24~48 小時（或其他依特殊需求所制訂之時間）注射本劑。試驗結果顯示，95% 豬隻會於注射後 36 時內完成分娩，其中 70% 集中於注射後 24±5 小時內。

**【注意事項】**

前列腺素（包括 PGF<sub>2</sub>α）可經皮膚吸收，可能引起氣管痙攣及流產現象。因此使用本劑時應避免直接接觸皮膚或不慎自我注射。懷孕婦女、有氣喘病史及其他呼吸道問題者應避免操作本劑；若必須使用，應穿戴拋棄式塑膠手套。若使用時不慎潑灑於皮膚上，應立刻以大量清水沖洗。若不慎吸入或自我注射引起突發性呼吸窘迫，應迅速給予吸入型氣管擴張劑（如 isoprenaline、salbutamol）迅速就醫。

**【其他事項】**

1. 請勿使用於預產期不詳之懷孕動物。過早注射本劑會造成死胎數增加。
2. 請存放於 30°C（室溫）以下之陰暗處。
3. 藥品開封後應於 28 天內使用完畢。若溶液已混濁、變色、有雜質，不可使用。
4. 空瓶需以紙類包裹後方可丟棄。
5. 本處方藥品限由執業獸醫師（佐）使用。

**【停藥期】**

肉豬：屠宰前一日。

**【包裝規格】** 每瓶 20ml 毫升 10 瓶/盒。

澳洲爵洛士大藥廠製造  
JUROY Pty. Ltd. 85 Gardiners Rd, Rutherford, NSW 2320, Australia  
建盈股份有限公司總代理 台北市信義路四段 307 號 12 樓  
服務電話：0800212818