

滅蟲 333

IVERMECIDE 333

動物用治療用散劑

動物藥製字第 07851 號

【成份】每公克中含有：

Ivermectin 6mg (0.6% W/W)

【適應症】

在推薦劑量下將本產品和飼料均勻混合能有效的驅除下列寄生蟲。

外寄生蟲：豬穿孔性疥癬蟲、豬蝨。

內寄生蟲：豬蛔蟲、豬腎蟲、紅色毛樣線蟲、豬腸結節蟲等之成蟲及第四期幼蟲；以及豬胃蟲、藍松氏豬桿線蟲、豬肺蟲等之成蟲。

【用法用量】

推薦劑量為每公斤體重每天給予 100 微毫克連續 7 天，在大部份情況下以每公噸飼料中含 IVERMECTIN 2 克(2ppm)來餵飼。對於 40 公斤體重以下的豬隻可在每公噸飼料中添加 333 公克的本產品。

對於 40 公斤體重以上的豬隻，常配合限食計劃或餵食高蛋白質飼料時，每日平均飼料攝取量可能低於 5% 的體重應採食量，為了要使 40 公斤體重或更重的豬隻仍能攝取到有效劑量，在每公噸 IVERMECTIN 應該提高到 2.4 公克(2.4ppm)，因此在每公噸飼料中必須添加本產品 400 公克。

肥育豬隻的正確劑量換算表：

豬隻體重(公斤)	本劑在飼料中的含量比例 (公克/每噸飼料)	IVERMECTIN 在飼料中濃度 (PPM)	最少應採食的飼料量
40 公斤以下	333	2.0	50 公克/公斤活體體重
40 到 100 公斤	400	2.4	42 公克/公斤活體體重

以上用法用量應先做充分預拌均勻混合於飼料中並且依規定連續的餵飼 7 天。

【建議治療計劃】

肥育豬群應轉移到清潔的環境中連續 7 天接受驅蟲治療。但對豬群以全部移進移出的治療方式實施有困難的話，建議改採已在房舍內的全體豬隻同時一開始就接受集體治療方式。

註(1)：

已接受驅蟲的豬隻如果再接觸到感染有寄生蟲感染的動物或接觸到受污染的環境，可能造成再次感染。所以豬隻應避免在一週內再接觸到未接受驅蟲的豬隻或正在接受驅蟲的豬隻。

註(2)：

外寄生蟲蟲卵約需要三週的時間來孵化，因此可能需要再次重複實施驅蟲計劃。

【注意事項】

1. 本產品應置於兒童伸手不及處。
2. 接觸本產品時不可抽煙或進食，接觸本產品後必需洗手。
3. 研究結果顯示當 IVERMECTIN 與土壤接觸時會很快的與土壤緊密的包埋在一起，最後變成沒有活化性的物質。本產品廢容器及殘留物必須依照環境保護規定處理。避免殘留的 IVERMECTIN 造成魚類及某些水中生物的不良反應。
4. 停藥期：豬 5 天。
5. 本劑須由執業獸醫師或執業獸醫佐處方使用。

【包裝】：

333 公克粉末