

洛乳好 LC

泌乳期專用 廣效乳房炎軟膏

MAXALAC L.C.

Intramammary Antibiotic

【成分】每公克含：Cefuroxime Sodium 92.2mg
每管(3公克)含Cefuroxime...250mg(pot.)

【效能】牛：用於泌乳期乳牛，治療革蘭氏陰性(包括具penicillin抗性菌)、陽性菌引起之臨床性乳房炎。本品為油質，能迅速釋出Cefuroxime，使藥物均勻分布於乳汁中，讓乳房組織與乳汁內的藥物濃度迅速達到治療 高峰。Cefuroxime為第二代、半合成頭孢子素，不會被革蘭氏陰性、陽性致乳房炎病原分泌的β-lactamase分解破壞，因此對革蘭氏陰性、陽性致乳房炎病原具有廣效殺菌力。本品可用於治療多種病原所引起的臨床性乳房炎，包括：Staphylococcus spp, Staphylococcus aureus(包括對penicillin具耐受性者)、Streptococcus agalactiae、Streptococcus dysgalactiae、Streptococcus uberis、Escherichia coli、Enterobacter spp.、Klebsiella spp.、Citrobacter spp.、Corynebacteria spp.(包括Arcanobacterium pyogenes)、與Micrococcus spp.。有鑑於此，本品非常適合用來治療乳房炎主要致病原引起的臨床性乳房炎。

【用法用量】

1. 擠乳結束後，徹底清潔乳房並消毒乳頭(可用酒精棉消毒)。
2. 握住管身，輕輕旋轉並筆直拉開保護蓋，避免汙染注射頭。
3. 將注射頭完全沒入乳頭溝，輕壓管壁徐徐注入軟膏，直至所有藥劑送出為止。一手按住乳頭，另一手輕柔按摩乳房，促進藥物均勻分布。
4. 投藥完成後，建議使用乳頭專用浸泡消毒液進行後續抗菌處理。
5. 若依獸醫師指示改變劑量、投藥頻率、方式、或治療疾病，需延長停藥期。

【注意事項】

1. 治療中的乳牛，其乳汁不可供人飲用。
2. 進行乳房內注射時，請戴手套操作。注射前，請徹底清潔乳房並消毒。
3. 每隔12小時需自乳頭溝為每一受感染乳房注入一管(一劑量)，連續治療3次。
4. 請遵照獸醫師指示使用，配合各場之乳房炎控制計畫。
5. 若操作人員出現中毒症狀，請立即就醫處理。使用後之空管請妥善包裹後再丟棄。
6. 請存放於室溫陰涼(低於30°C)、孩童無法取得之處。
7. **本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用。**
8. 產品批號、製造日期及有效期限請參考瓶身標貼。

【停藥期】肉用：7天。

乳用：最後一次用藥後72小時內取得之乳汁(6次擠乳)不得供人飲用或加工，亦不可餵予小牛飲用。

【包裝】3公克/管。

【保存期限】18個月。

澳洲爵酪士(JUROX)大藥廠出品JUROX Pty. Limited 85 Gardiner Road Rutherford, NSW 2320 Australia
建盈股份有限公司總代理 台北市建國北路二段 137 號 11 樓 0800-212-818₁₀₆₋₀₄

洛乳好 LC

泌乳期專用 廣效乳房炎軟膏

MAXALAC L.C.

Intramammary Antibiotic

【成分】每公克含：Cefuroxime Sodium 92.2mg
每管(3公克)含Cefuroxime...250mg(pot.)

【效能】牛：用於泌乳期乳牛，治療革蘭氏陰性(包括具penicillin抗性菌)、陽性菌引起之臨床性乳房炎。本品為油質，能迅速釋出Cefuroxime，使藥物均勻分布於乳汁中，讓乳房組織與乳汁內的藥物濃度迅速達到治療 高峰。Cefuroxime為第二代、半合成頭孢子素，不會被革蘭氏陰性、陽性致乳房炎病原分泌的β-lactamase分解破壞，因此對革蘭氏陰性、陽性致乳房炎病原具有廣效殺菌力。本品可用於治療多種病原所引起的臨床性乳房炎，包括：Staphylococcus spp, Staphylococcus aureus(包括對penicillin具耐受性者)、Streptococcus agalactiae、Streptococcus dysgalactiae、Streptococcus uberis、Escherichia coli、Enterobacter spp.、Klebsiella spp.、Citrobacter spp.、Corynebacteria spp.(包括Arcanobacterium pyogenes)、與Micrococcus spp.。有鑑於此，本品非常適合用來治療乳房炎主要致病原引起的臨床性乳房炎。

【用法用量】

1. 擠乳結束後，徹底清潔乳房並消毒乳頭(可用酒精棉消毒)。
2. 握住管身，輕輕旋轉並筆直拉開保護蓋，避免汙染注射頭。
3. 將注射頭完全沒入乳頭溝，輕壓管壁徐徐注入軟膏，直至所有藥劑送出為止。一手按住乳頭，另一手輕柔按摩乳房，促進藥物均勻分布。
4. 投藥完成後，建議使用乳頭專用浸泡消毒液進行後續抗菌處理。
5. 若依獸醫師指示改變劑量、投藥頻率、方式、或治療疾病，需延長停藥期。

【注意事項】

1. 治療中的乳牛，其乳汁不可供人飲用。
2. 進行乳房內注射時，請戴手套操作。注射前，請徹底清潔乳房並消毒。
3. 每隔12小時需自乳頭溝為每一受感染乳房注入一管(一劑量)，連續治療3次。
4. 請遵照獸醫師指示使用，配合各場之乳房炎控制計畫。
5. 若操作人員出現中毒症狀，請立即就醫處理。使用後之空管請妥善包裹後再丟棄。
6. 請存放於室溫陰涼(低於30°C)、孩童無法取得之處。
7. **本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用。**
8. 產品批號、製造日期及有效期限請參考瓶身標貼。

【停藥期】肉用：7天。

乳用：最後一次用藥後72小時內取得之乳汁(6次擠乳)不得供人飲用或加工，亦不可餵予小牛飲用。

【包裝】3公克/管。

【保存期限】18個月。

澳洲爵酪士(JUROX)大藥廠出品JUROX Pty. Limited 85 Gardiner Road Rutherford, NSW 2320 Australia
建盈股份有限公司總代理 台北市建國北路二段 137 號 11 樓 0800-212-818₁₀₆₋₀₄